



KONTAKTNÍ CENTRUM RIAPS Trutnov radí:

Co dělat, najdete-li pohozenou injekční stříkačku?

Nález injekční stříkačky není příjemná situace. Použité injekční jehly a stříkačky mohou být zdrojem infekčních chorob (HIV, žloutenky), proto jsou likvidovány jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se tedy dostat na volně přístupná prostranství. Přesto se může stát, že odhozenou stříkačku objevíte. V této chvíli existuje několik možností řešení:

- 1) Nález volně odhozené injekční stříkačky **nahlaste**:
 - **terénním pracovníkům RIAPSu Trutnov**, kteří je seberou, zajistí jejich bezpečnou likvidaci a místo nálezu budou dále monitorovat.
Kontakt: mobil 731 441 269, tel. č. 499 828 144, e-mail: kcentrum@riaps.cz
 - **Policii ČR** nebo **Městské policii** na linkách 158 a 156, které zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob.

2) **Informujte okolí** o nález, aby se o stříkačku nikdo neporanil.

3) **V krajním případě**, není-li vyhnutí (v okolí se např. pohybují děti), můžete stříkačku zlikvidovat sami. V tuto chvíli buďte velmi opatrní, neboť jistě u sebe nemáte pro sběr předepsané ochranné pomůcky. Stříkačku seberte papírovým kapesníčkem, či listem rostliny a vložte jehlou dolů nejlépe do plechovky, poté plechovku sešlápněte a vyhodte do koše.

Můžete též stříkačku vložit do PET lahve, láhev pevně zašroubujte a vyhodte.

Injekční stříkačka se sbírá zásadně za píst, nikoliv za jehlu!

Nikdy jehlu od stříkačky neoddělujte!

I v tomto případě **informujte terénní pracovníky RIAPSu Trutnov** o místě nález. Pracovníci se na okolí nález zaměří. Budou ho průběžně sledovat a zjišťovat, zda se jedná o ojedinělý případ, příp. o místo, kde se odhozený infekční materiál vyskytuje pravidelně.

Co dělat, poraníte-li se o pohozenou injekční stříkačku?

Při poranění o odhozenou stříkačku byste měli udělat tato opatření:

- 1) Bezprostředně po poranění nechat ranku volně krvácet (krvácení sníží dávku případného viru). Ranku nemačkat!
- 2) Po zastavení krvácení ranku důkladně vymýt vodou a mýdlem a ošetřit dezinfekčním roztokem (Jodisol, 0,2% Persteril).
- 3) **Co nejdříve vyhledat praktického lékaře**, lékaře hygienické stanice či nejbližší infekční oddělení nemocnice.

